

МНН

Сульпирид

Фармакотерапевтическая группа:

Психотропные препараты. Нейролептики (антипсихотики). Бензамиды. Сульпирид.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Сульпирид является наиболее известным представителем атипичных нейролептиков из группы замещенных бензамидов. Обладает умеренной нейролептической активностью в сочетании со стимулирующим и тимоаналептическим (антидепрессивным) действием.

Нейролептический эффект связан с дофаминоблокирующим действием. Сульпирид блокирует в центральной нервной системе (ЦНС) преимущественно дофаминергические рецепторы мезолимбической и гипоталамо-гипофизарной системах, незначительно воздействуя на таковые в неостриатной системе.

Для большинства бензамидов характерно двухкомпонентное влияние: стимуляция дофаминергической передачи при низких дозах преимущественной блокадой в префронтальной области – пресинаптических D2/D3 ауторецепторов (усиливая высвобождение дофамина), а в лимбической – постсинаптических (блокируя дофаминовую трансмиссию). Степень блокирования дофаминовых D2 рецепторов бензамидами при PET обследовании (позитронной эмиссионной томографии), колеблется в пределах 60 – 80 %; после применения сульпирида в дозе 400 мг - составляет 75 %.

Повышенное высвобождение дофамина при низких дозах определяет его эффективность при негативных психотических симптомах и депрессивных признаках в ЦНС связывают улучшение настроения, с уменьшением – развитие симптомов депрессии.

Антипсихотическое действие сульпирида проявляется в дозах более 600 мг в сутки, в дозах до 600 мг в сутки преобладает стимулирующее и антидепрессивное действие.

Сульпирид не оказывает значительного воздействия на адренергические, холинергические, серотониновые, гистаминовые и ГАМК-рецепторы.

Стимулирует секрецию пролактина и обладает центральным антиэметическим эффектом (угнетение рвотного центра) за счет блокады дофаминовых D2-рецепторов триггерной зоны рвотного центра.

В небольших дозах сульпирид может применяться как вспомогательное средство при лечении психосоматических заболеваний, в частности, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. При синдроме раздраженной толстой кишки снижает интенсивность абдоминальных болей.

Эти различия в воздействии сульпирида определяют широту спектра терапевтической активности и применения сульпирида как нейролептика при высоких дозах и как антидепрессанта, а в низких дозах - лекарственное средство при головокружениях различной этиологии.

Фармакокинетика

Всасывание

Сульпирид абсорбируется в желудочно-кишечном тракте.

Биологическая доступность лекарственных форм, предназначенных для приема внутрь, составляет около 25-35 %, и характеризуется значительной индивидуальной вариабельностью. Максимальная концентрация сульпирида в плазме крови (C_{max}) достигается через 3-6 часов, и составляет 0,73 мг/л и 0,25 мг/л при приеме одной таблетки, содержащей 50 мг.

Показания к применению

Таблетки 50 мг

Взрослые:

- Психосоматические заболевания, обычно проявляющихся расстройствами пищеварения (функциональная диспепсия верхних отделов, функциональная диспепсия желудка и кишечника, диарея, запоры).
- Нейропсихические нарушения, сопровождающихся беспокойством и головокружением различной этиологии, особенно в гериатрии.

Дети:

- Психозы, нарушения поведенческих реакций, чрезмерный страх и энурез.

Таблетки 200 мг

- Острая и хроническая шизофрения.
- Тяжелые психотические расстройства, сопровождаемые, хронический алкоголизм галлюцинациями, растерянностью, бредовые состояния: параноидный бред галлюцинаторный психоз.
- Тяжелые депрессии, возникшие под влиянием внешнего раздражителя, сопровождающие хронический алкоголизм, депрессии у людей пожилого возраста и депрессивные фазы душевных расстройств, характеризующиеся циклическим проявлением, психические расстройства, чрезмерной двигательной активностью и склонностью к агрессивному поведению по отношению к окружающим.

Помимо ряда тяжелых душевных расстройств к показаниям применения препарата Просульпин 200 мг также относится лечение временных нервных расстройств (неврозов), сопровождающихся навязчивыми идеями и действиями, подавленностью, бредовыми представлениями и галлюцинаторными сенсорными обманами.

Препарат предназначен для взрослых, подростков и детей, вес которых превышает 40 кг.

Дозировка и способ применения

Таблетки 50 мг

Дозировка для взрослых:

Просульпин 50 мг 1 – 2 таблетки 3 раза в сутки, то есть 150 – 300 мг сульпирида в сутки.

Таблетки 200 мг

Дозировка для взрослых:

Острые и хронические психотические расстройства: суточная доза составляет от 400 мг до 2 000 мг, разделенная на несколько приемов. При лечении психофункциональных расстройств доза обычно составляет 200 мг в сутки.

Во всех случаях следует назначать минимальные эффективные дозы препарата. Если клиническое состояние пациента позволяет, лечение должно начинаться с низких доз. Минимальная эффективная доза препарата подбирается путем постепенного повышения дозы до достижения необходимого эффекта.

Не рекомендуется принимать препарат во второй половине дня (после 16 часов) в связи с возможным активизирующим действием препарата.

Дозы для пациентов с нарушением функции почек: в связи с тем, что до 92 % сульпирида выводится из организма преимущественно через почки, рекомендуется уменьшить дозу сульпирида и/или

увеличить интервал между приемом отдельных доз препарата в зависимости от показателей клиренса креатинина (КК).

Клиренс креатинина	Снижение обычно назначаемой суточной
30–60 мл/мин	50% обычно назначаемой суточной дозы
10–30 мл/мин	30% обычно назначаемой суточной дозы
< 10 мл/мин	20% обычно назначаемой суточной дозы

Дозировка для детей и подростков:

Рекомендуемая начальная дозировка составляет 1–2 мг/кг/в сутки, в случае необходимости дозу можно повысить до 5 мг/кг/в сутки. Суточная доза разделяется на 2–3 приема.

У детей и подростков принимаемая доза сульпирида не должна превышать 10 мг/кг/в сутки.

Дозы препарата для пожилых пациентов:

начальная доза должна составлять 1/4–1/2 дозы для взрослых

Способ применения:

Внутрь, запивая небольшим количеством воды, независимо от приема пищи.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к сульпириду и/или вспомогательным веществам препарата, острое отравление алкоголем, снотворными средствами, наркотическими анальгетиками, эпилепсия, феохромоцитома, острая порфирия, гиперпролактинемия, пролактинзависимые опухоли (пролактинома гипофиза, рак молочной железы), психомоторное возбуждение, одновременный прием с леводопой, одновременное применение с агонистами дофаминовых рецепторов (каберголином, хинаголидом и др.), за исключением пациентов с болезнью Паркинсона, врожденная галактоземия, глюкозо-галактозная мальабсорбция или дефицит лактазы (в связи с наличием в составе препарата лактозы), беременность, период грудного вскармливания

Побочные действия

Как правило, препарат Просульпин 50 мг и 200 мг хорошо переносится больными. Большинство нежелательных воздействий имеет незначительный и временный характер.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель

ПРО.МЕД. ЦС Прага а.о.

Телска 377/1, Михле, 140 00 Прага 4, Чешская Республика.

Регистрационное удостоверение:

DV/X 04627/07/18 товар сертифицирован

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:

ООО "PROMEDCS CA"

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Шота Руставели, 53Б

Просульпин®

Сульпирид

Препарат для коррекции психосоматических нарушений



- Эффективное воздействие на тревожные и депрессивные расстройства
- Благоприятные соматотропные эффекты
- Сроки наступления эффекта – 1–2-е сутки
- Отсутствие значимых побочных эффектов
- Прием 1 раз в день до 16:00
- Сроки терапии от 3-х до 6 мес.

Просульпин®

Путь к согласию души и тела!



Просульпин®

Таблетки 50 мг в упаковке № 30

Таблетки 200 мг в упаковке № 30